


Dr. GEERT TITS
Dr. VALÉRIE VAN DAMME

Dienst Inwendige Geneeskunde- Longziekten - Allergie

Informatieblad Mediastinoscopie



Dr. Geert Tits – Dr. Valérie Van Damme
Dienst Inwendige Geneeskunde – Longziekte-Allergie
vzw Sint-Andriesziekenhuis Tielt
Tel 051 425 160 (secretariaat Inwendige Geneeskunde)
Krommewalstraat 9-11
8700 Tielt

Geachte patiënt,

Met behulp van deze kijkoperatie kan men onderzoeken of langs de luchtpijp afwijkende weefsels of zieke lymfklieren aanwezig zijn.

Mede op basis van dit weefselonderzoek zal de verdere behandeling van een longziekte bepaald worden.

De voorbereiding

Voor deze ingreep wordt u doorgaans twee dagen in het ziekenhuis opgenomen.

U dient voor de ingreep minimaal vier uur **nuchter** te zijn, dat wil zeggen niet meer eten of drinken. Meld de arts of verpleegkundigen als u verkouden bent of koorts heeft.

Gebruikt u bloedverdünnende middelen zoals Sintrom mitis of Marcoumar, meld dit dan vooraf aan uw arts.

Voor de ingreep krijgt u uitleg en medicijnen (premedicatie) van de anesthesist.

Het onderzoek

Onder algemene narcose (u bent volledig in slaap gebracht), wordt een kleine incisie (snede) gemaakt van 4 à 5 cm onderaan in de hals (boven het borstbeen). Via deze snede wordt een hol buisje ingebracht, dat langs de grote luchtpijp wordt geleid tot aan de klieren of het te onderzoeken gebied.

Door het buisje worden stukjes weefsel / klieren weggenomen.

Als het onderzoek is afgerond, wordt de snede opnieuw gehecht. De ingreep duurt ongeveer ½ tot 1 uur.

De nazorg:

Na de ingreep wordt u naar de “verkoeverkamer” (= uitslaapkamer) gebracht. Als u goed wakker bent, komt u weer op de afdeling terug. Hier kunt u rustig bijkomen terwijl regelmatig uw bloeddruk, pols, het wondje in het infuus gecontroleerd worden.

Met de wonde mag u gewoon douchen (liefst geen zitbad). Een dag na het onderzoek mag u weer naar huis.

De ingreep wordt algemeen als weinig belastend ervaren.

Na 7 dagen worden de hechtingen verwijderd.

Soms ontstaat door de ingreep een hese stem gedurende enkele dagen. Dit verdwijnt weer spontaan.

De snede kan nog wat pijn doen en u kan de zwelling voelen.

Hiervoor kan men een pijnstiller zoals Dafalgan nemen.

Als zeer zeldzame verwickelingen vermelden we: bloeding, locale infectie,...