


Doel van gastroscopie

Bij een gastroscopie wordt een soepele sonde (gastroscoop) gebruikt om de binnenkant van de slokdarm, de maag en het duodenum (= twaalfvingerige darm, het begin van de dunne darm) te onderzoeken.

Het onderzoek wordt meestal gebruikt om:

1. Eventuele letsels te zien en zo de reden te achterhalen van slikmoeilijkheden, misselijkheid, braken, zuurbranden, maagbloeding, indigestie, buikpijn of pijn op de borst
2. Zo nodig stukjes weefsel van de slokdarm, maag of duodarmwand te nemen (= biopsies) voor microscopisch onderzoek
3. Zo nodig een behandeling uit te voeren (poliepen wegnemen, bloedingen stoppen, een vernauwing verbreden...)



Vorbereiding, de dag van het onderzoek

U moet vanaf **6 uur voor het onderzoek vasten** (= niets eten of drinken), omdat voedselresten het zicht ernstig kunnen belemmeren. We vragen u ook 6 uur ervoor niet te roken.

Het onderzoek gebeurt onder **slaapmedicatie** om u eventuele ongemakken bij het onderzoek te besparen.

Vermeld ook uw medicatie, zeker wanneer het "bloedverdunners" zijn zoals aspirine (Asaflow, Cardio aspirine, ASA 100 ...), Plavix, Ticlid, Brilique, Sintrom, Marevan, Marcoumar, Pradaxa, Lixiana, Xarelto en Eliquis. Deze bloedverdunners hoeven normaal gezien niet op voorhand te worden gestopt bij een gastroscopie, tenzij op vraag van uw arts.





Uw gezondheid, onze zorg.

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tiel
T 051 42 51 11
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

Inwendige Ziekten

T 051 42 51 60
interne@sintandriestielt.be
www.gastrotielt.be



10/06/26

