

- Een infectieuze bronchitis of lichte dyspnoe is geen reden tot uitstellen van de injectie. Alleen bij ernstige dyspnoe kan de injectie worden uitgesteld.
- Een hyposensibilisatie wordt meestal stopgezet wanneer :
 - a) na 1 à 2 jaar geen verbetering is opgetreden
 - b) in de loop van de behandeling het klachtenpatroon toeneemt
 - c) in de loop van de behandeling belangrijke locale reacties of algemene reacties worden waargenomen ondanks aanpassen van de toegediende doses.
- Bewaring : in de koelkast (+4° à +8°C), maximaal 6 maanden (NIET bevriezen !!)



Uw gezondheid, onze zorg.

20/04/18

Dienst Inwendige Geneeskunde - Longziekten - Allergie

Sint-Andriesziekenhuis vzw
 Bruggestraat 84, 8700 Tiel
 T 051 42 51 11 - F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be



Hyposensibilisatie (HAL - PURETHAL) Instructies

Informatiebrochure



- Hyposensibilisatie dient gedurende ongeveer 3 jaar ononderbroken voortgezet te worden. De vaccins worden toegestuurd aan de patiënt.

- De allergeendosis wordt progressief opgedreven tenzij zich bij de vorige toediening lokale reacties hebben voorgedaan. De injectie dient daarom in principe door een geneesheer te gebeuren.

- > De injecties worden subcutaan toegediend in een huidplooï bij voorkeur op de zijvlakte van de bovenarm ter hoogte van de deltoïdspier.

- > Een tuberculinespuit, voorzien van een naald voor S.C.-injectie is wenselijk (25 G1 of 25/6). Alvorens in te spuiten dient de zuiger even teruggetrokken. Indien bloed geaspireerd wordt, dient een andere injectieplaats te worden gekozen. De injectie dient langzaam te gebeuren.

- Elk flacon wordt in stijgende dosissen toegediend, zoals aangegeven in het bijgevoegde schema.

- De frequentie van de injecties wordt aangegeven in het bijgevoegde schema.

- Het is belangrijk dat het doseringsschema en de regelmaat zorgvuldig worden nageleefd.

- Indien het schema onderbroken werd gedurende :
 - 2 weken : herhaal de laatste dosis
 - 3 weken : halveer de laatste dosis
 - 4 weken : reduceer tot een kwart van de vorige dosis



◦ langer dan 4 weken : de dosis van de flacon dient herzien te worden en er wordt best een nieuw flacon voorgeschreven.

- Voorzorgsmaatregelen : een garrot en adrenaline 1 % dienen bij de hand te zijn.

De patiënt wordt een dertigtal minuten onder controle gehouden. Indien zich een algemene reactie zou voordoen, wordt de garrot boven de injectieplaats aangebracht. Boven de garrot alsook ter hoogte van de injectieplaats wordt 0,25 mL S.C. toegediend. Dit kan zonodig herhaald worden na 15 minuten.

Een corticoïd-preparaat zal I.V. en een antihistaminicum I.M. worden toegediend. Zulke situatie noopt tot contactname.

Een lokale kwaddel van 2 cm diameter is aanvaardbaar. Bij sterkere lokale reacties wordt de dosis bij de volgende injectie niet opgedreven, eventueel zelfs gereduceerd.

Zeer zeldzaam kunnen urticaria, rhinitis of kortademigheid als zogenaamde late reacties tot 24 uur na de inspuiting voorkomen. Aanpassing van de dosis is dan ook wenselijk.

(Tijdens de zwangerschap wordt een behandeling niet gestart. De behandelende arts moet beslissen over het al dan niet voortzetten van een reeds gestarte hyposensibilisatie. Voortzetting kan mits minder vlug stijgen van de dosis.)

- Na elke injectie moet de patiënt gedurende 30 min. onder medisch toezicht blijven. zware lichamelijke inspanningen, zware maaltijden, alcohol gebruik en sterke temperatuursverschillen (warm bad, sauna, ...) worden best in de eerste drie uren na de injectie vermeden.

