

[illegible]





## Voorschriften

Laat uw arts de nodige formulieren ondertekenen:

- een vertrouwelijk voor de mutualiteit
- een formulier voor de hospitalisatieverzekering
- een attest voor de werkgever
- een voorschrift voor de postnatale sessies.

Vraag eventueel aan uw arts een voorschrift voor een ijzerpreparaat, pijnstillers, ontstekingsremmers, anticonceptie, een kinkhoestvaccin voor de partner.

## Afspraken

U maakt best zo snel mogelijk een afspraak bij de gynaecoloog voor de nacontrole. Ongeveer 6 weken na de geboorte verwacht de arts u op zijn/haar consultatie.

De kinderartsen vragen eveneens om uw baby na 1 week en 1 maand te laten nakijken omwille van eventuele hartafwijkingen die pas laattijdig op te sporen zijn.

Wanneer u wenst bij de kinderarts op consultatie te gaan, maakt u best een afspraak online [www.afspraakkinderarts.be](http://www.afspraakkinderarts.be) of elke werkdag van 7:30 tot 11:15 op 051 42 52 69.

## Informatie voor u persoonlijk

### Hygiëne na een vaginale bevalling of keizersnede

Vaginaal bloedverlies kan een zestal weken aanhouden. Zorg daarom voor een goede hygiëne. Regelmatig douchen, spoelen, verversen van maandverband...

Het nemen van een bad stelt u het best uit tot twee weken na de bevalling.

Seksuele betrekkingen zijn af te raden wanneer er nog sprake is van bloedverlies.





# Informatie voor de zorgverlener thuis

## Verslag arbeid en bevalling

- Zwangerschapsduur: .....
- G ..... P .....
- Behandelende arts: .....
- Arts bij bevalling: .....
- Verloop arbeid: spontaan - inductie - optimalisatie
- Reden inductie: .....
- Epidurale: ja - nee
- GBS: positief - negatief
- Bevallen op .....om .....
- Wijze van verlossing: spontaan – vacuüm – sectio
- Placenta: spontaan – manueel

## Kraamperiode in ziekenhuis

Bloedgroep: .....

Toegediende medicatie:

- Pijnstilling: .....
- Lactatieremmers: .....
- Andere: .....

## Aandachtspunten voor de nazorg

- Perineum: episiotomie - ruptuur
- Sectiowonde: hechtingen mogen verwijderd worden op ...../...../.....
- Hemorroiden: .....
- Andere: .....
- Medicatie: .....





## Neonatale screening

Een heel klein aantal kinderen wordt geboren met een aangeboren stofwisselingsstoornis. De aangeboren stoornis is vanaf de bevruchting aanwezig maar komt pas na de geboorte tot uiting.

De aangeboren stoornis kan leiden tot ziektes waarbij meestal hersenbeschadiging optreedt. Als de aangeboren stoornis vroeg ontdekt wordt, kan ze in de meeste gevallen op een eenvoudige wijze behandeld worden en kunnen ernstige of chronische aandoeningen voorkomen worden.

Meer info op <http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Bevolkingsonderzoek>  
Het onderzoek is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen. Bij weigering van het onderzoek moet er een document ondertekend worden.

De bloedafname hiervoor gebeurt tussen de 3de en 5de dag na geboorte van uw kindje. Meestal gebeurt dit in de materniteit, maar bij thuis-of poliklinische bevallingen neemt de huisarts of vroedvrouw het staal af.

Als het resultaat van het onderzoek afwijkend is, wordt de dokter verwittigd en is een tweede test nodig. Dit gebeurt doorgaans ten laatste 3 weken na de eerste bloedafname. Indien het afwijkend resultaat ook door de tweede test wordt bevestigd, kan een aangepaste behandeling worden gestart.







## Flesvoeding

Hoe bereiden:

Gebruik niet bruisend bronwater, geschikt voor zuigelingenvoeding.

Het is van groot belang om hygiënisch te werk te gaan bij het bereiden van de voeding. Bereid fles per fles, dus niet voor de volledige dag!

- Om een flesje van 100 ml te bekomen neemt u 90 ml water + 3 afgestreken maatjes
- Een flesje van 133 ml: 120 ml water + 4 maatjes
- Een flesje van 166 ml: 150 ml water + 5 maatjes
- Een flesje van 200 ml: 180 ml water + 6 maatjes
- Een flesje van 233 ml: 210 ml water + 7 maatjes
- Een flesje van 266 ml: 240 ml water + 8 maatjes

## Vitamines

## Vitamin K

Vitamine K speelt een rol bij de bloedstolling. Een baby wordt geboren met steriele darmen, waardoor er onvoldoende vit. K in zijn lichaampje aanwezig is.

Bij de geboorte kreeg uw kindje een inspuiting met vit. K. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze behandeling moet verdergezet worden om een voldoende resultaat te bekomen.

- Bij borstvoeding: vanaf 1 week dagelijks 5 druppels vitamon K in het mondje van de baby druppelen, dit tot de leeftijd van 3 maand. Indien stop BV, stop vitamon K
- Bij flesvoeding: geen vitamon K nodig omdat kunstvoeding zelf is aangevuld met vitamine K.

## D-cure

Vitamine D is belangrijk voor de opbouw van de beenderen en de tandjes. De gebruikelijke dosis is 5 druppels 1x/dag in het mondje van de baby druppelen, dit gedurende 6 jaar, zowel bij borstvoeding als flesvoeding. Soms is een hogere dosering nodig op advies van de kinderarts. Je geeft de vitaminen best op een vast tijdstip.

# Weetjes over uw baby in de kraamtijd

## Hoeveel luiers heeft uw baby per dag?

### **Bij borstvoeding:**

vanaf dag 4 heeft een baby een zestal natte luiers per dag met heldere urine en minimum 2 keer stoelgang. De kleur van de stoelgang kan variëren maar is meestal eigeel. Borstvoedingsstoelgang is slapjes van consistentie.

### **Bij flesvoeding:**

vanaf dag 4 heeft een baby een zestal natte luiers per dag met heldere urine. Sommige baby's hebben niet elke dag stoelgang. De consistentie en de kleur van de stoelgang is afhankelijk van welke soort kunstvoeding uw baby krijgt.

## Krampjes

Darmkrampjes komen bij heel wat baby's voor, ze verdwijnen vanzelf. De baby is niet ziek. Krampjes komen zowel voor bij borstvoeding als bij flesvoeding.

### **Hoe herkent u krampjes?**

- Uw baby huilt krachtig en luid
- Het huilen komt en gaat
- Uw baby is moeilijk te troosten
- Uw baby wordt rood door te huilen
- Uw baby beweegt wild met de beentjes en armpjes
- Uw baby is gespannen, hij overstrekt zich
- Uw baby laat windjes

### **Hoe kan u uw baby troosten tijdens de krampjes?**

- Leg uw baby met zijn buikje tegen uw arm
- Geef uw baby een badje
- Hou uw baby stevig vast en hou uw manier van troosten vol
- Baker uw baby in (vraag hiervoor advies aan uw vroedvrouw)
- Schud uw baby nooit!
- Blijf zelf rustig
- Weet dat de krampjes verdwijnen
- Laat het troosten eens aan een ander over!





# Preventieve maatregelen omtrent wiegendood

## 1. Slaapomgeving

Leg de baby op een stevige matras aangepast aan bed of wieg. Gebruik geen hoofdkussens. Voorkom het gevaar voor ophanging of verstikking, zoals koorden die rond nek kunnen draaien, knuffels of andere voorwerpen die baby's gezicht kunnen bedekken.

## 2. Slaaphouding

Leg je kind steeds op zijn rug tenzij je arts, om medische redenen, een andere houding aanraadt.

## 3. Kamertemperatuur

Zorg er voor dat je kind het niet te koud of te warm heeft om te slapen. Een kamertemperatuur tussen 18 – 20° C is aan te raden.

Dek je baby lichtjes toe. Een laken en een deken of een slaapzak (aangepast aan de grootte van je kind) zijn voldoende. Gebruik liever geen donsdeken, want baby kan eronder geraken.

## 4. Rookvrije omgeving

Roken, zowel tijdens de zwangerschap als na de geboorte is ten zeerste af te raden. Laat niemand roken in het bijzijn van je kind, niet in huis, niet in de wagen.

## 5. Geen geneesmiddelen zonder doktersvoorschrift

Geef je kind geen enkel geneesmiddel zonder doktersvoorschrift en zeker geen hoestsiroop of kalmerende middelen.

Bij borstvoeding neem je best geen enkel geneesmiddel zonder je arts te consulteren.

## 6. Algemene aanbevelingen

Respecteer het slaapritme van je kind en zorg ervoor dat het voldoende slaap krijgt. De kamer waarin het slaapt, moet dagelijks verlucht worden.

Men zal de aanwezigheid van huisdieren in de kamer van de slapende zuigeling vermijden.

Tijdens de zomer laat je je baby regelmatig drinken om uitdroging te voorkomen. Laat je baby nooit alleen in de wagen.



## Redenen tot waakzaamheid

Wanneer je baby na een hevige huilbui in slaap gevallen is, ga je best even kijken of alles goed gaat.

Raadpleeg zo snel mogelijk een arts wanneer je kind één of meerdere van volgende tekens vertoont:

- Een rectale temperatuursverhoging boven de 38°C of onder de 36°C bij een baby beneden de 6 maand
- Een recente gedragsverandering: baby is zeer kalm of opgewonden
- Je baby kreunt terwijl hij slaapt of terwijl hij wakker is
- Je baby geeft over of wil niet eten
- Je baby heeft ademlast

Raadpleeg ook je arts als je baby:

- Ongewoon bleek ziet
- Ongewoon veel zweet tijdens zijn slaap zonder aanwijsbare reden
- Luidruchtig ademt of snurkt zonder een infectieziekte te hebben

## Controles

Voor dringende gevallen kunt u contact opnemen met de kinderafdeling:  
051 42 52 70

Om een afspraak te maken met de kinderarts kunt u:

- Het secretariaat raadplegen  
051 42 52 69, elke werkdag van 7.00 tot 11.15 uur
- Online agenda  
[www.afspraakkinderarts.be](http://www.afspraakkinderarts.be) 24/24u

Kind en gezin brengt u een bezoek tijdens uw verblijf op de materniteit en komt binnen de eerste twee weken na ontslag bij u thuis langs. U kunt ze ook bereiken op weekdagen tussen 8.00 en 20.00 uur op 078 15 01 00.

## Nuttige links

- [www.sintandriestielt.be](http://www.sintandriestielt.be)
- [www.vbov.be](http://www.vbov.be)
- [www.kindengezin.be](http://www.kindengezin.be)





Uw gezondheid, onze zorg.

**Pediatrie T 051 42 52 69**  
**Dringende gevallen Pediatrie T 051 42 52 70**  
**[www.afspraakkinderarts.be](http://www.afspraakkinderarts.be)**  
**Materniteit T 051 42 52 60**

Sint-Andriesziekenhuis vzw  
Bruggestraat 84, 8700 Tielt  
T 051 42 51 11 - F 051 42 50 20  
[info@sintandriestielt.be](mailto:info@sintandriestielt.be)  
[www.sintandriestielt.be](http://www.sintandriestielt.be)

20171220

