

Informatiebrochure



Geachte heer, mevrouw,

Uw geneesheer heeft bij u een proctologisch onderzoek afgesproken. Om ervoor te zorgen dat u voldoende geïnformeerd bent over het onderzoek en het doel ervan, vragen we u deze tekst te lezen. Dit is wel een algemene folder, het is belangrijk om u te realiseren dat uw persoonlijke situatie anders kan zijn dan hieronder beschreven.

- Doel en principe van een proctologisch onderzoek
- Voorbereiding
- Verloop van het onderzoek
- Duur van het onderzoek
- Veiligheid en risico's
- Vragen en info



Doel en principe van een proctologisch onderzoek

Bij een proctologisch onderzoek wordt klinisch (met de vinger en handschoenen) en endoscopisch (met een eenvoudig toestel, de anuscoop of rectoscoop) een onderzoek van de anus, het anaal kanaal en (een deel van) de endeldarm uitgevoerd.

Het slijmvlies van (een deel van) de endeldarm en van het anale kanaal wordt daarbij met het blote oog doorheen een stevige buis geïnspecteerd (niet met een camera zoals bij andere endoscopische onderzoeken).

Het onderzoek kan worden aangevraagd om symptomen te evalueren (bloed in stoelgang, anale jeuk of pijn,...) of als behandeling van aandoeningen zoals speen (= aambeien = hemorroiden), een anaal abces of fistels.

Vorbereiding

U moet niet nuchter zijn voor een proctologisch onderzoek.


Het is verstandig voor het onderzoek even te gaan plassen zodat u een lege blaas heeft.

Eventueel zal voor het onderzoek (zeker i.g.v. rectoscopie) een klein lavement worden geplaatst door de verpleegkundige.

Het onderzoek vindt plaats in de onderzoekskamer van de endoscopie unit (gelocaliseerd op de poli interne).


Het is belangrijk de onderstaande zaken van te voren met uw arts te bespreken:

- Medicatie die u inneemt of tot voor kort innam (zeker bloedverduunners)
- Ademhalingsproblemen
- Hartproblemen
- Kunstkleppen hart
- Zwangerschap (of vermoeden van)
- Overgevoeligheid voor lidocaïne (verdoving)



Verloop van het onderzoek

- U neemt plaats op de onderzoekstafel
- Houding: steunend op ellebogen en knieën
Alternatief bij anuscopie: linker zijlig
- Arts inspecteert de anus
- Hierop volgt een onderzoek met de vinger (= rectaal toucher)



- Hierna volgt een anusscopie of rectoscopie: arts brengt een buisje (met voldoende glijmiddel op de top ingesmeerd) in via de aars. Dit laat toe om tot in de endeldarm te kijken.
- Een proctologisch onderzoek doet normaal geen pijn en vereist meestal geen verdoving

Duur van het onderzoek

De punctie zelf neemt ongeveer 5 10 minuten in beslag. Wanneer een behandeling zal worden uitgevoerd (zoals bv. van aambeien) kan het onderzoek langer duren.

Veiligheid en risico's

Een proctologisch onderzoek op zichzelf is heel veilig.

Behandelingen houden een iets groter risico in, maar ze zijn ook veilig. Uw arts bespreekt vooraf de mogelijke verwikkelingen.

Indien u naar huis gaat na het onderzoek en er zich de eerste uren of dagen na het onderzoek ernstige problemen stellen, dient u uw huisarts te contacteren of de behandelende maag-darmspecialist (via secretariaat 051 42.51.60) of dient u zich buiten de werkuren op spoedopname aan te melden.

Vragen en info

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over dit onderzoek?

Aarzel dan niet om deze bij uw onderzoek aan uw behandelend arts te stellen.

Maag-, darm- en leverziekten – Digestieve oncologie

- Dr. De Coninck
- Dr. Beyls
- Dr. Baertsoen
- Dr. De Decker

Mocht u om dringende redenen uw afspraak niet kunnen nakomen, verwittigt u secretariaat inwendige geneeskunde. Er kan dan een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Secretariaat interne

T 051 42 51 60

interne@sintandriestielt.be

datum:

uur:

- Inschrijven bij dienst centrale inschrijving - gelijkvloers
- Plaatsnemen in wachtzaal C 1e verdiep Route 30

Vragen?

[illegible]



**Dienst Inwendige Geneeskunde
Gastro-enterologie**

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tiel
T 051 42 51 11 - F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

15/05/18

