



Meer info?

*Hebt u na het lezen
van deze folder nog vragen?*

*Aarzel niet om uw gynaecoloog,
kinderarts of vroedvrouw aan te spreken.*



Uw gezondheid, onze zorg.

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
T 051 42 51 11 - F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

CMV

Informatiebrochure



03/05/18



Cytomegalovirus (CMV) is een veel voorkomend virus) dat mensen van alle leeftijden kan besmetten.

CMV komt voor in lichaamsvloten (bijv. speeksel, urine). Besmetting kan gebeuren door contact met deze vloten.

CMV blijft na infectie in het lichaam aanwezig en kan opnieuw actief worden, zogenaamde "CMV-reactivatie"

1 tot 4 % van de zwangere vrouwen kunnen tijdens de zwangerschap voor het eerst met CMV besmet worden of een reactivatie ondergaan. Indien de infectie tijdens de zwangerschap wordt doorgegeven aan de foetus spreken we van een congenitale of aangeboren infectie. Minder dan 5% van de kinderen met een congenitale CMV-infectie heeft symptomen bij de geboorte. De meerderheid wordt dus geboren zonder symptomen (asymptotisch). Maar ook deze asymptomatische kinderen kunnen tijdens de eerste levensmaanden en -jaren problemen krijgen met het gehoor, het zicht of de neurologische ontwikkeling.

Besmetting gebeurt meestal door contact met een besmet kind.

Dit is niet steeds mogelijk maar zwangere vrouwen én hun partner kunnen een aantal voorzorgsmaatregelen nemen:

- Vermijd contact met speeksel en urine van jonge kinderen en was de handen voldoende met water en zeep, zeker na luierswisseling.
- Geef jonge kinderen geen kusjes op de mond of op de wang.
- Deel geen eetgerei, zak- en of handdoeken en washandjes.

Er bestaat een medicamenteuze behandeling via siroop.

Daarnaast worden deze kinderen nauwkeurig opgevolgd op het vlak van gehoor, zicht en neurologische ontwikkeling.

Tijdens de zwangerschap is het zeer moeilijk om te weten welke moeder het CMV-virus doorgeeft aan haar foetus. Daarenboven worden de meeste kinderen met een congenitale CMV-infectie geboren zonder symptomen.

In het Sint-Andriesziekenhuis bieden we elke pasgeborene een speekseltest aan waarmee een CMV-infectie kan opgespoord worden.

Kort na de geboorte kan de vroedvrouw een beetje speeksel van de pasgeborene afnemen door met een borsteltje (wisser) over de binnenkant van de wang te wrijven.

Het resultaat van deze wisser na enkele dagen beschikbaar zijn. Indien CMV aanwezig is in het speeksel van de pasgeborene, zal ter bevestiging een tweede onafhankelijke controle worden uitgevoerd op urine. Bij bevestiging in de urine zullen verdere onderzoeken gebeuren om te zien of behandeling nodig is.

Er zijn geen risico's verbonden aan deze test.

De kostprijs is 20 euro, niet terugbetaald. Indien de diagnose van een congenitale CMV-infectie wordt gesteld, zal de kinderarts voorstellen om een aantal bijkomende onderzoeken uit te voeren. Deze onderzoeken worden wel grotendeels terugbetaald.

Het Vlaams CMV-register

In 2007 werd in Vlaanderen gestart met het verzamelen van gegevens over kinderen met een congenitale CMV-infectie om een beter beeld te krijgen van de problematiek. Opname van de gegevens van een kind in dit register gebeurt enkel na schriftelijke toelating van de ouders.
De kinderarts zal dit met u bespreken.

