

Meer info?

*Hebt u na het lezen van deze folder
nog vragen? Neem dan zeker
contact met ons op.*

Kinderafdeling
Sint-Andriesziekenhuis
T 051 42 52 70



Aanvullende vaccinaties op het schema van Kind en Gezin



Meningokokken

- Veroorzaakt hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging.
- Symptomen zijn in het begin van de ziekte moeilijk herkenbaar.
- Infecties kunnen levensbedreigend zijn in de loop van enkele uren, zelfs met antibiotica.
- Frequent restletsels bij overleven, hersenschade, gehoorverlies, amputatie lidmaat, nierprobleem ...

1. Nimenrix

= Vaccin tegen meningokokken type ACWY

- Treft vooral kinderen tussen 0 en 9 jaar en 15 en 19 jaar
- Aantal gevallen laatste jaren in opmars

Kostprijs ?

- 52,60 euro niet terugbetaald
- 1e dosis vanaf 15 maanden (of op 15 jaar samen met herhalingsvaccinatie)

2. Bexsero

= Vaccin tegen meningokokken type B

- Treft vooral kinderen tussen 0 en 5 jaar en tussen 15 en 19 jaar
- Zeldzaam (1/100000 personen per jaar) maar op dit moment meest voorkomende type meningokok in België.

Kostprijs ?

- 87 euro per vaccin, voorlopig niet terugbetaald
- Vanaf 2 maanden = 3 dosissen
- Vanaf 2 jaar = 2 dosissen

Bijwerkingen van beide vaccins

- 2-tal dagen koorts
- Roodheid, gevoeligheid injectieplaats
- Spierpijn

Beste ouders,

Het is belangrijk om uw kind te vaccineren. De vaccinaties beschermen niet alleen uw kind, maar ook uw gezin en omgeving. Naast het klassieke vaccinatieschema van Kind en Gezin worden er nog een aantal vaccinaties sterk aanbevolen. Aan de hand van deze folder willen we u daarom informeren over wat dit precies inhoudt.

Indien u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, aarzel dan niet om uw arts hierover aan te spreken.



Windpokken

Varilrix of Provarivax

= Vaccin tegen windpokken

- Meestal goedaardige kinderziekte
- Soms complicaties:
 - bacteriële huidinfectie
 - longontsteking
 - hersenweefselontsteking
 - 1 à 2 overlijdens per jaar in België

Kostprijs ?

50 euro per vaccin
Voorlopig niet terugbetaald
• Vanaf 12 maanden = 2 dosissen

Bijwerkingen van het vaccin

- 2-tal dagen koorts
- Roodheid, gevoeligheid injectieplaats

Bron: kinderartsen
Sint-Andriesziekenhuis,
7 november 2019

