

Epidurale infiltratie

Informatiebrochure



Na de behandeling

- Bij de infiltratie ter hoogte van de **nekwervels** dient de patiënt nadien **2 uur plat te liggen**, tot de arts hem/haar op het dagziekenhuis komt ontslaan. Deze tijd is noodzakelijk om het mengsel zo goed mogelijk te laten inwerken in de epidurale ruimte en eventuele nevenwerkingen vroeg op te sporen.
- Bij de infiltratie ter hoogte van de **onderrug** dient de patiënt nadien **1 uur plat te liggen**. Nadien kunt u voorzichtig opstaan en zich aankleden.
- Het kan gebeuren dat u een warmtegevoel en/of krachtsverlies ervaart in de benen of armen. Dit is niet verontrustend en wordt veroorzaakt door het verdovend middel dat na enkele uren is uitgewerkt.
- Gedurende **de rest van de dag doet u het best wat rustig aan**. Enkele uren na de behandeling, wanneer de verdoving is uitgewerkt, kan tijdelijk napijn optreden. Dit wordt veroorzaakt door het prikken en doordat de behandeling plaatsvond in reeds geïrriteerd weefsel. Dit is volkomen normaal, omdat de plaatselijke verdoving is uitgewerkt. U mag hiervoor een pijnstiller innemen (Paracetamol of Tramadol) en eventueel uw huisarts contacteren om de pijnmedicatie aan te passen.
- Het resultaat van de infiltratie laat vaak enkele dagen op zich wachten. U doet er daarom goed aan uw pijnstilling nog even verder te nemen.
- Meestal zijn meerdere infiltraties (met een tussenpoos van enkele weken) nodig om tot een succesvol resultaat te komen. Bij een aantal patiënten zullen de pijnklachten en tintelingen volledig verdwijnen, bij anderen slechts verminderen. Het resultaat is moeilijk te voorspellen en afhankelijk van de ernst van de onderliggende aandoening die de klachten veroorzaakt.
- Leven met pijn heeft een negatieve invloed op je levenskwaliteit. Indien u dit wenst kan een psycholoog ondersteuning bieden. Praat erover met uw pijnarts of pijnverpleegkundige.



Mogelijke complicaties

- *Infectie ter hoogte van de insteekplaats:*
Door de genomen voorzorgsmaatregelen is de kans op infectie zeer klein. Infecties worden gekenmerkt door roodheid van de insteekplaats, zwelling, pijn en temperatuursverhoging.
- *Hersenvliesontsteking (meningitis):*
Heel uitzonderlijk en komt doordat de naald in aanraking is gekomen met bacteriën. De eerste tekenen hiervan zijn hoge koorts of nekpijn. Als u één of meerdere van deze symptomen hebt na de infiltratie moet u contact op nemen met de arts van de pijnkliniek, of de dienst spoedgevallen van het Sint-Andriesziekenhuis op het nummer 051 42 50 67.
- *Bloeduitstorting:*
Deze kan ontstaan als een bloedvatje is geraakt. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook napijn. Bloeduitstortingen kunnen nagenoeg vermeden worden door doelbewust na te vragen welke bloedverdünnende medicatie u gebruikt.
- *Allergische reactie op contraststoffen of corticoïden:*
Meestal ontstaat enkel plaatselijk roodheid, zwelling en jeuk. Soms zijn deze reacties meer algemeen aanwezig. Daarom is het belangrijk dat u gekende allergieën vermeldt.
- *Hoofdpijn:*
Dit is normaal na het prikken. Echter, in zeldzame gevallen, is hoofdpijn bij rechtkomen een gevolg van het doorprikken van het membraan dat het ruggenmerg omringt, met lekkage van hersenvocht tot gevolg. Bij persistente hoofdpijn moet u contact op nemen met de arts van de pijnkliniek, of met de dienst spoedgevallen van het Sint-Andriesziekenhuis.
- *Bij aanhoudend krachtsverlies, urineverlies en/of plasproblemen,*
dient u de dienst spoedgevallen te contacteren.





Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 TielT
T 051 42 51 11 - F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

18/11/19

Pijnteam

T 051 42 57 26

pijnteam@sintandriestielt.be

