

Hoe lang moet er beademd worden?

Het beademen kan enkele uren tot enkele dagen duren. Wanneer de toestand en de conditie verbetert, kan de patiënt weer zonder beademingsmasker ademen. De ademhalingsondersteuning met het mond-neusmasker bouwen we in stapjes af. Hoelang dit duurt is voor elke patiënt verschillend.

Als de beademingsondersteuning via het mond-neusmasker onvoldoende effect geeft, zal de arts overgaan tot invasieve beademing.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze altijd stellen aan een van de verpleegkundigen of intensivisten.

Vragen en info

Intensieve zorgen

051 42 51 40

Bron: dienst intensieve zorgen
Sint-Andriesziekenhuis, 15 januari 2020



Uw gezondheid, onze zorg.

Niet-invasieve beademing

Informatiefolder



Uw gezondheid, onze zorg.

Intensieve zorgen
051 42 51 40

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tiel
T 051 42 51 11 - F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be



Beste mevrouw, meneer

Uw partner of een familielid van u is opgenomen op de afdeling intensieve zorgen en heeft moeite met ademen. Hiervoor wordt hij/zij geholpen door een niet-invasieve beademingsmachine. In deze folder wordt uitleg gegeven over deze vorm van beademing.

Wat is non-invasieve beademing?

Bij 'non-invasieve beademing' krijgt de patiënt een masker over de neus en mond. De patiënt ademt zelf. Het masker is verbonden aan een beademingsapparaat waarmee lucht en zuurstof naar de patiënt worden geblazen. De machine wordt zo ingesteld dat de longen voldoende lucht en zuurstof krijgen met de minst mogelijke inspanning voor de patiënt.

Wat houdt de behandeling in?

Het beademingsmasker bedekt de mond en neus en wordt met elastieken bandjes op het gezicht bevestigd. Hierdoor zit het masker strak op het gezicht. Dit is nodig om de beademing goed te kunnen toepassen. Wanneer de patiënt inademt, geeft de machine lucht mee en krijgt de patiënt meer lucht binnen. De patiënt hoeft daardoor minder snel te ademen en minder inspanning te leveren.

Voor een patiënt is non-invasieve beademing vaak niet makkelijk te ondergaan. Door de benauwdheid en daardoor veroorzaakte onrust ervaren patiënten het masker vaak als onprettig en oncomfortabel. De eerste uren zijn vaak het moeilijkst, maar het is van groot belang dat de patiënt daar doorheen komt, zodat de beademing optimaal kan verlopen.

Gedurende de beademing kan het apparaat regelmatig een alarm geven. Deze alarmen zijn voor de verpleegkundige bedoeld om eventueel instellingen aan te passen. Daarnaast voert de verpleegkundige regelmatig een aantal controles uit, zoals de controle van de bloeddruk, de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed. Daarbij zal er een aantal keren bloed worden afgenomen.

Voordelen van non-invasieve beademing

- Tijdens non-invasieve beademing is de patiënt aanspreekbaar en in staat om te praten.
- Non-invasieve beademing kan op elk moment gestopt en gestart worden. Hierdoor kan een patiënt afwisselend zelfstandig ademen of ondersteund worden door de beademingsmachine.
- Non-invasieve beademing veroorzaakt minder luchtweginfecties ten opzichte van invasieve beademing.
- Onderzoek heeft uitgewezen dat non-invasieve beademing korter nodig blijkt dan invasieve beademing waardoor het verblijf op de Intensieve Zorgen ook korter is.

Risico's van non-invasieve beademing

De patiënt kan drukplekken op voorhoofd, neusbrug en kin krijgen door het strakke masker. Om dit te voorkomen kan een beschermend verband aangebracht worden.

De ogen kunnen geïrriteerd raken door lekkage van lucht langs het masker.

Communiceren

De patiënt kan gewoon praten terwijl het beademingsmasker op de mond en neus zit. Dit kost echter wel veel inspanning en energie. Beperk u daarom tot korte vragen waarop de patiënt 'ja' of 'nee' kan antwoorden.

Voeding

Waarschijnlijk heeft de patiënt een maagsonde en een infuus waardoor voeding en vocht toegediend worden. De maagsonde wordt onderlangs via het beademingsmasker geleid. Wanneer de patiënt weer zelf mag eten en drinken, doen de verpleegkundigen het beademingsmasker even af.

