

Vragen en info

Secretariaat urologie

T 051 42 50 60

op werkdagen tussen
08.00 - 12.30 en 13.30 - 18.00 uur

Artsen

Dr. van den Heuvel Mariëtte

Dr. Elshout Pieter Jan

Verpleegkundige urologie Leslie Vrient

051 42 54 91

Spoedopname

T 051 42 50 67

Adres

Sint Andriesziekenhuis VZW

Bruggestraat 84

8700 Tielt

T 051 42 51 11

www.sintandriestielt.be

www.urologietielt.be



Uw gezondheid, onze zorg.

Prostaatpunctie

onder anesthesie



Uw gezondheid, onze zorg.

Urologie
051 42 50 60

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
T 051 42 51 11 - F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be - www.sintandriestielt.be

02/06/21

Bron: dienst urologie Sint-Andriesziekenhuis,
2 juni 2021



Wat houdt een prostaatpunctie in

Bij een prostaatpunctie wordt via de anus een echosonde geplaatst die de prostaat in beeld brengt. Via deze sonde wordt verschillende keren een punctienaald in de prostaat gebracht om wat prostaatweefsel te bekomen. Dit weefsel wordt dan door de anatoompatholoog in het laboratorium onderzocht.

Voor de punctie

Het onderzoek vraagt geen speciale voorbereiding, behalve de eenmalige inname van een antibioticum de dag zelf. U krijgt hiervoor een voorschrift op de consultatie die voorafgaat aan de punctie. Bepaalde bloedverduuners moeten worden gestopt, ook dit wordt besproken op de consultatie. U moet nuchter zijn, dat betekent drank en lichte maaltijd ten laatste 6 uur voor de procedure, en heldere vloeistof ten laatste 2 uur voor de procedure.

Verloop van de punctie

U wordt opgenomen op het chirurgisch dagziekenhuis. Van daaruit wordt u naar de operatiezaal gebracht waar het onderzoek doorgaat. Als u onder narcose bent, wordt u in linker zijligging geplaatst, waarna de echosonde in de anus wordt gebracht om de prostaat in beeld te brengen. Aansluitend kunnen de biopsies, dunne sliertjes weefsel, worden genomen.

Na de punctie

U zult 2 à 3 uur van het dagziekenhuis weg zijn, de tijd op de ontwaakruimte meegerekend. Indien de verdoving voldoende is uitgewerkt kunt u terug naar de afdeling. U mag dezelfde dag naar huis, maar u mag niet zelf naar huis rijden. Door het nemen van de puncties kan de prostaat wat bloeden, het is dan ook niet abnormaal als u enige dagen wat bloed in de urine ziet. Ook bloed in het sperma is mogelijk, dit kan enige weken blijven bestaan. Doordat doorheen de darmwand wordt geprikt, is het ook mogelijk dat u enkele dagen wat bloed in de stoelgang heeft.

Mogelijke complicaties

Infectie

Om dit te voorkomen krijgt u de eenmalige dosis antibioticum, maar in 2 tot 5 % van de gevallen is dit onvoldoende en ontstaat er een ontsteking. Dit zal zich uiten door koorts, pijn bij het plassen, rillingen. Op dat moment moet u zeker de huisarts of onze dienst contacteren, of de spoedgevallendienst van het ziekenhuis.

Plasproblemen door klontervorming

Dit is zeldzaam, om dit te voorkomen adviseren we u na de punctie enkele dagen wat meer te drinken dan anders, en regelmatig te gaan plassen. Als u door de klonters niet meer kunt plassen, contacteert u uw huisarts, onze dienst of de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis.

Plasproblemen door zwelling van de prostaat na de biopsienam

Ook dit is zeldzaam, als het gebeurt dat u niet meer kunt plassen, contacteer dan uw huisarts, onze dienst of de spoedgevallendienst van het ziekenhuis.

Een prostaatpunctie geeft **GEEN** verhoogd risico op uitzaaien van prostaatkanker.

