

Vaccinaties bij IBD-patiënten

ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Informatiebrochure



Inleiding

*Patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa hebben door het innemen van **immuunonderdrukkende medicatie**(*) een verhoogd risico op infecties.*

U kan zich best zo goed mogelijk beschermen daartegen, door enerzijds hygiënische maatregelen toe te passen, ondervoeding voorkomen, maar ook door vaccinaties.

Deze worden besproken met uw arts/verpleegkundige vooraleer u een behandeling wordt opgestart. Een vaccinatieschema zal worden uitgewerkt, afhankelijk van de ziekteactiviteit en soort behandeling die u krijgt.

() corticoiden (medrol®), imuran®, purinethol®, methotrexate®, biologicals zoals remicade/remsimab®, entyvio®, humira/hulio/hyrimoz/amgevita/imraldi®, stelara®, xeljanz®,..*

Overzicht

We splitsen de vaccins op in 'levende verzwakte en niet-levende vaccins'.

De levende verzwakte vaccins mogen niet toegediend worden tijdens immuun suppressieve therapie. Ze moeten 1 maand voor opstart of 1 à 3 maanden (afhankelijk van behandeling) na stopzetten van de therapie gegeven worden. Dit omdat ze aanleiding zouden kunnen geven tot de infectieziekte, waarvoor ze u eigenlijk zouden moeten beschermen.



LEVENDE VERZWAKTE VACCINS

GELE KOORTS

(via reiskliniek UZ Gent)

- Stamaril® 53.5 €

Deze vaccinatie heeft u enkel nodig indien u plannen heeft om te reizen naar bepaalde gebieden in Afrika en Zuid- Amerika. In de meeste van deze landen is deze vaccinatie bovendien verplicht.

Zie www.ibdpassport.com

Ze is levenslang geldig, maar een 'booster'-vaccinatie wordt na 10 jaar wel aanbevolen.

VARICELLA ZOSTER (WIND- OF WATERPOKKEN)

- Varilix® 48.56 € 2x
- Provavirax® 69.00 € 2x
- Zostavax ® 148.63 € 1x

UITZONDERING: Shingrix® 2x 209 € -> zonder stoppen medicatie

De meeste mensen hebben als kinds reeds wind- of waterpokken doorgemaakt en kunnen ze niet opnieuw meer krijgen. Ze kunnen wel nog een zona-opstoot krijgen, al dan niet uitgelokt door de behandeling.

Weet u niet zeker of u deze hebt doorgemaakt als kind, kan dat eenvoudig in uw bloed worden bepaald. Bent u niet beschermd, dan wordt best een vaccinatie opgestart met 2 insputingen, met 4-8 weken tussen.

BOF / MAZELEN/ RUBELLA (RODE HOND) = BMR

- PRIORIX® 22.39 € 2x
- MMR vax PRO® 2x gratis via vaccinet-huisarts voor personen geboren na 1970
43.00 € 2x met tussentijd van 4weken

De meeste mensen hebben deze 3-ledige vaccinatie gekregen als kind. Ook hier geldt het principe van blijvende immuniteit of bescherming. In zeldzame gevallen zal de arts bij diagnose een booster van dit vaccin voorschrijven die bestaat uit 2 insputingen, met een interval van minimum 4 weken.



NIET LEVENDE VACCINS

INFLUENZA OF GRIEP

- Influvac tetra ® 16.55 €
(2.45 € remgeld voor mensen met verhoogde tegemoetkoming, mits speciale vermelding op voorschrift en 4.08 € voor anderen)
- Alpharix tetra® 16.55 €
(6.77 € in geval van terugbetaling)

U laat zich best jaarlijks vaccineren tegen griep, en dit tussen half oktober en half december. Het risico op besmetting is niet alleen groter, ook het verloop van de ziekte kan veel ernstiger zijn.

Het beste tijdstip is niet bepaald, maar wordt aangeraden ongeveer 5 dagen voor volgende therapie.

PNEUMOKOKKEN

- Prevenar 13 90.00 €
- Pneumovax 23 39.50 €

De pneumokok is een agressieve bacterie, die vooral long- en hersenvliesontstekingen kan veroorzaken. Er wordt dan ook sterk aangeraden deze vaccinatie te laten zetten.

Deze 2- ledige vaccinatie wordt gezet met een tussentijd van minimum 8 weken, en nadien wordt pneumovax 2 elke 5 jaar herhaald.

Patiënten die in het verleden reeds een inspuiting met pneumovax 23 kregen maar nog niet met prevenar 13, worden geadviseerd deze laatste pas toe te dienen na 1 jaar.

Er is een gedeeltelijke terugbetaling van deze vaccinatie mogelijk via uw ziekenfonds. (+/- 25 €).



HEPATITIS A EN B

HEPATITIS A

- Havrix® 45.66 € 2x met tussentijd van 6 maand, 30j geldig
- Avaxim® 43.31 € 2x
- VAQTA® 45.66 € 2x

HEPATITIS B

- Engerix® 26.49 € 3x met tussentijd van 1 en 6 maand
- Fendrix® 54.39 € 4x
- Hbvax PRO® 22.04 € 3x

Door middel van een bloedafname, wordt bij aanvang van uw therapie gekeken of u die vaccins ooit gekregen heeft, en/of u de ziekte zelf al heeft doorgemaakt en voldoende beschermd bent voor de toekomst.

Er bestaat ook een combinatiepreparaat, voor hepatitis A en B

- Twinrix® 54.60 € 3x met tussentijd van 1 en 6 maand

Er bestaat nog geen vaccin voor hepatitis C

TETANUS OF KLEM

- Triaxis® gratis via huisarts
- Boostrix® 23.65 €
-> combinatievaccins tetanus/ difterie/pertussie = klem/kroep/kinkhoest
- Tedivax pro adulto® 8.31€ (enkel difterie en tetanus)

Wanneer je niet of niet volledig gevaccineerd bent tegen tetanus, is het zinvol deze te vervolledigen. Daarvoor heb je 3 vaccinaties nodig en ben je daarna voor 10 jaar beschermd. Deze vaccinatie bestaat enkel in een combinatievaccin.

- Boostrix polio® beschermt ook tegen polio (= kinderverlamming)



HPV OF HUMAAN PAPILLOMAVIRUS

- Cervarix® 69.14 € of gratis via vaccinet of school voor 15 jaar 2x met tussentijd van 6 maand en na 15 jaar 3x met tussentijd van 1 en 6 maand
- Gardasil® 134 € 3x met tussentijd van 2 en 6 maand

HPV is de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening (SOA). Deze kan leiden tot (genitale) wratten, maar ook tot kanker van anus, baarmoeder, penis, mond en keel. De vaccinatie werd vanaf 2002 gestart via CLB, en dit voor de leeftijd van 15 jaar en eerste seksuele betrekkingen. Ze bestaat uit 3 insputingen over een periode van 6 maanden.

Sinds 2010-2011 biedt de Vlaamse Overheid het vaccin gratis aan voor alle meisjes en jongens in het eerste jaar secundair onderwijs. Het gaat om een aanbod en geen verplichte vaccinatie.

TOT SLOT

De weergegeven prijzen voor vaccinaties zijn slechts een geschatte kostprijs op basis van de voor ons beschikbare info in 2021 !

Vaccinaties worden door de huisarts geregistreerd in vaccinetnet en zijn ook terug te vinden in Cozo.

Een regelmatige update van uw dossier is vanzelfsprekend van belang.

CONTACT / VRAGEN

Hebt u vragen, contacteer dan de [IBD- verpleegkundige](#)
ann.bommerez@sintandriestielt.be of 051 42 56 91

Het secretariaat inwendige ziekten kan u in geval van afwezigheid ook contacteren
interne@sintandriestielt.be of 051 42 51 60

Interessante websites:

- www.laatjevaccineren.be
- www.ibdpassport.com
- www.myhealthviewer.be
- www.mijngezondheid.be





Uw gezondheid, onze zorg.

IBD - verpleegkundige
051 42 56 91

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
T 051 42 51 11 - F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

16/05/22

