Vragen en info

Secretariaat urologie

T 051 42 50 60

heelkunde@sintandriestielt.be

www.urologietielt.be

Artsen

- Dr. Elshout Pieter Jan
- Dr. Marchand Wouter
- Dr. Van de Caveye Inge
- Dr. van den Heuvel Mariëtte

Dagziekenhuis heelkunde

T 051 42 51 80

Spoedopname

T 051 42 50 67

Adres

Sint Andriesziekenhuis VZW
Bruggestraat 84
8700 Tielt

T 051 42 51 11

www.sintandriestielt.be

Bron: dienst urologie, Sint-Andriesziekenhuis,
08 september 2026, art._200

TIELT SINT-ANDRIES ZIEKENHUIS

Uw gezondheid, onze zorg.

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
T 051 42 51 11
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

08/09/26

TIELT SINT-ANDRIES ZIEKENHUIS

Uw gezondheid, onze zorg.

Hydrocoele en Spermatocoele

Informatiefolder

Wat is een hydrocoele en spermatocoele?

Een hydrocoele is een goedaardige zwelling van het scrotum, gevuld met vocht.

Bij een spermatocoele is er een zwelling ter hoogte van de bijbal.

Een spermatocoele is vaak los van de zaadbal te voelen, terwijl bij een hydrocoele de zaadbal zelf in de vochtophoping zit.

Vóór de operatie

Op doktersadvies moet u soms een aantal preoperatieve onderzoeken ondergaan (bv. bloedafname, EKG). Veel onderzoeken kunnen via de huisarts gebeuren.

Bloedverdunnende medicatie dient gestopt te worden (minstens één week vóór de ingreep).

Dag van de operatie

- U moet nuchter zijn. U mag dus niets meer eten of drinken vanaf middernacht vóór de ingreep.
- U meldt zich bij de opnamedienst van het ziekenhuis aan. Van hieruit wordt u begeleid naar het chirurgisch dagziekenhuis.
- Op deze afdeling worden uw naam en geboortedatum gecontroleerd en wordt uw identificatiebandje aangedaan.
- De operatiezone zal geschoren worden.
- Voor het vertrek naar de operatiekamer doet u een operatiehemd aan.

Verloop van de ingreep

U gaat kort in slaap voor de ingreep. De verdoving kan volledig of gedeeltelijk (via ruggenprik) zijn. Dit gebeurt in overleg met de arts en anesthesist.

U zal ongeveer twee tot drie uur van de afdeling weg zijn. De operatie zelf is van wisselende duur, maar na de ingreep brengt u ook enige tijd door op de ontwaakruimte.

Indien de verdoving voldoende is uitgewerkt, komt u terug naar de afdeling en krijgt u een kamer toegewezen.

Nazorg en ontslag

Als u op de kamer komt, hebt u een infuus waarlangs pijnstillende medicatie kan toegediend worden. De verpleegkundigen geven u enkele voorgeschreven pijnstillers mee naar huis voor ± 2 dagen. Na de ingreep kan u paracetamol als pijnstiller innemen, dit kan u in de apotheek verkrijgen.

Verwittig altijd een verpleegkundige vooraleer u voor de eerste maal na de operatie wil opstaan. Drinken mag reeds een paar uur na de ingreep. ’s Avonds mag u al een lichte maaltijd nemen.

U zal een klein droog verbandje hebben ter hoogte van de operatieplaats. Zolang dit verbandje droog blijft, hoeft u dit niet te verversen. De draadjes zullen zelf resorberen. U draagt best een goed aansluitend onderbroek, ook ’s nachts. Hiermee vermindert u de kans op zwelling. De eerste week na de ingreep doet u het best rustig aan.

Bij ontslag krijgt u een afspraak voor controle en een ontslagbrief voor de huisarts mee. Na de ingreep mag u niet zelf naar huis rijden.

Uw thuismedicatie mag u na de operatie verder nemen. Grote uitzondering: sommige bloedverdunners mogen pas opnieuw ingenomen worden na advies van de arts.

U neemt contact met de huisarts, behandelende arts of u komt naar spoed in geval van:

- Hevige pijn, ondanks de pijnstilling
- Niet kunnen plassen
- T° > 38,5°

Wij wensen u een goede thuiskomst en spoedig herstel

De verpleegkundigen