

Vedolizumab

Informatiebrochure



Vedolizumab (Entyvio®)

Patiënten met een inflammatoire darmziekte (ziekte van Crohn of colitis ulcerosa) hebben een verhoogde ontstekingsreactie in de darm. Witte bloedcellen spelen een belangrijke rol bij deze ontsteking. Vedolizumab is een biologisch geneesmiddel dat via een infuus of injectie wordt toegediend. Het behoort tot de groep van monoklonale antilichamen en werkt enkel op de darmen in. Deze geneesmiddelen verhinderen dat witte bloedcellen uit de bloedvaten naar de darm gaan verhuizen. Hierdoor neemt de ontsteking in de darm af.

1. Opstartfase

Voor de behandeling start, wordt u gecontroleerd op (in)actieve tuberculose en andere ernstige infecties (zoals hepatitis). Hiervoor zal er een longfoto gebeuren (Rx thorax), bloedafname en eventueel een Mantouxtest.

De eerste drie infusen worden tijdens de opstartfase op week 0, week 2 en week 6 toegediend.

Vedolizumab wordt intraveneus toegediend. U krijgt een vaste dosis van 300 mg. Het duurt ongeveer 30 minuten vooraleer het infuus is ingelopen, nadien blijft u nog 1u na ter observatie. Als u de ziekte van Crohn heeft, kan er nog een extra toediening plaatsvinden op week 10.

- Als u colitis ulcerosa heeft, zal er op week 10 een linker coloscopie (darmonderzoekje van het laatste stukje van de darm, zonder verdoving) gebeuren om ziekte verder te evalueren.
- Bij de ziekte van Crohn vragen we op w10-14 een stoelgangstaal binnen te brengen

Verloop van een infuustoediening

Indien u koorts heeft, zich ziek voelt of om één of andere reden niet op uw dagopname aanwezig kan zijn, gelieve minimum 24 uur op voorhand de IBD-verpleegkundige Ann te verwittigen op 051 42 56 91 of IBD@sintandriestielt.be.

Schrijf u in bij de kiosk aan de ingang van het ziekenhuis. Bij opstart kan u 'voorinschrijven' voor 1 jaar aan de receptie. Dwz dat u bij iedere volgende dagopname nog enkel het e-ID moet ingeven in de kiosk en u meteen zal doorverwezen worden naar boven waar armbandje en etiketten zullen klaarliggen. U hoeft niet nuchter te zijn.

Ga naar route 30, wachtzaal C. De arts zal u binnenroepen in zijn/haar consultatieruimte. Indien u voor namiddag-/avondtoediening komt, gaat u meteen naar het dagziekenhuis.

Na consultatie bij de arts gaat u naar het dagziekenhuis inwendige route 34, 2de verdieping en meldt u zich aan bij de centrale verpleegpost.



Voor de toediening van een infuus, kan er een bloedafname gebeuren. Daarna worden de leidingen voor het infuus en de medicatie aangeschakeld. Na het inlopen van de medicatie moet er nog 30 minuten worden nagespoeld.

Tijdens uw verblijf op het dagziekenhuis zal Ann Bommerez, onze IBD-verpleegkundige u afzonderlijk zien.

U krijgt ook een contactmap omtrent uw IBD. Daarin vindt u uw volgende afspraak en/of onderzoek terug en verdere nodige info. Het beste is om dit telkens mee te brengen bij elke dagopname, alsook naar uw huisarts.

2. Onderhoudsbehandeling

Er zijn 2 mogelijke toedieningsvormen voor de onderhoudsbehandeling. Samen met de arts wordt er besproken welke toedieningsvorm er voor u het meest is aangewezen.

1/ De onderhoudsbehandeling in spuitvorm

De behandeling kunt u verder zetten in de vorm van spuitjes die u thuis zelf kan toedienen. Dit kan zowel in het bovenbeen als in de buik. U hebt de keuze om de medicatie via een spuit of een pen toe te dienen. Dit hangt af van uw persoonlijke voorkeur. De spuitjes hebben een vaste dosis van 108 mg.

De eerste inspuiting wordt gezet 4 weken na uw laatste infuus. Concreet houdt dit in dat u op week 0-2-6 een infuus krijgt en op week 10 uw eerste spuit. Vanaf dan worden de spuiten om de 2 weken toegediend.

De IBD-verpleegkundige legt u uit hoe u de spuiten/pennen precies moet gebruiken. Zij zal u bij de eerste 2 toedieningen begeleiden, nadien kan u dit zelfstandig thuis doen. Als u het niet ziet zitten om de inspuitingen aan te leren, kan dit ook door een partner/thuisverpleegkundige worden toegediend. De medicatie kan in de stadapotheek afgehaald worden met uw e-ID.

Nuttige info

- De medicatie blijft 7 dagen stabiel op kamertemperatuur (tot max 25°C). Als u niet kan verzekeren dat de medicatie op kamertemperatuur blijft (bv. in een warme auto) dan vervoert u de medicatie best in een koeltasje.
- Wanneer u zichzelf bent vergeten te injecteren, dient u de eerstvolgende injectie te nemen van zodra u het zich weer herinnert. De daarop volgende injectie neemt u op de dag dat u volgens uw originele schema ook uw volgende injectie moet nemen.



- ## 2/ De onderhoudsbehandeling in infuusvorm

Opstart	Planning
Voor start	Bloedafname, longfoto, vaccinaties, darmonderzoek (stoelgangsonderzoek/ beeldvorming NMR enterografie), contact IBD-verpleegkundige
Week 0	Toediening van het 1e infuus
Week 2	Toediening van het 2e infuus
Week 6	Toediening van het 3e infuus
Week 10	Linker coloscopie (colitis ulcerosa), stoelgangstest en 4e infuus (ziekte van Crohn)

1/ Onderhoud met spuitjes	Planning
Week 10	1e spuitje onder begeleiding IBD-VPK
Week 12	2e spuitje onder begeleiding IBD-VPK
Week 14	3e spuitje zelfstandig
6 maanden na start (= ong 3 maand na 1e spuitje)	Consultatie arts + bloedafname
9 maanden na start	Consultatie arts (+ labo)
1 jaar na start	Ileocoloscopie + labo (+stoelgangstest/ NMR enterografie)
Nadien verdere opvolging om de 6 maanden	

2/ Onderhoud met infusen	Planning
week 14	Toediening volgend infuus
week 22	Toediening volgend infuus
week ... (om de 8 weken)	Toediening volgend infuus
1 jaar na start behandeling	Ileocoloscopie + labo (+stoelgangstest/NMR enterografie)



Vragen en info IBD-team

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen over dit behandeling? Aarzel dan niet om deze voor uw onderzoek aan uw behandelend arts te stellen. Mocht u om dringende redenen uw afspraak niet kunnen nakomen, verwittigt u zo spoedig mogelijk de IBD-verpleegkundige. Er kan dan een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Secretariaat maag-, darm- en leverziekten

T 051 42 51 60

website www.gastrotielt.be

interne@sintandriestielt.be

1ste verdiep Route 30 wachtzaal C

Artsen Gastro-enterologen

- Dr. De Zutter Astrid
- Dr. De Coninck Steven
- Dr. De Decker Evelyne

IBD-verpleegkundige

Ann Bommerez

T 051 42 56 91

IBD@sintandriestielt.be

Spoedopname

Buiten de kantooruren, in het weekend en op feestdagen kunt u voor dringende problemen langskomen tot de dienst spoedgevallen van het Sint-Andriesziekenhuis, voor vragen spoeddienst T 051 42 50 67

Sint-Andriesziekenhuis

Bruggestraat 84
8700 Tielt

website www.sintandriestielt.be

T 051 42 51 11 algemeen onthaal ziekenhuis

Info

Crohn en colitis ulcerosa vereniging: www.ccv-vzw.be

www.wijhebbencrohn-colitis.be



Vragen?

[illegible]

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Uw gezondheid, onze zorg.

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
T 051 42 51 11 - F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

Inwendige Ziekten

T 051 42 51 60
interne@sintandriestielt.be
www.gastrotielt.be



25/04/23

