Vragen en info

Secretariaat urologie

T 051 42 50 60

heelkunde@sintandriestielt.be

www.urologietielt.be

Artsen

- Dr. Elshout Pieter Jan
- Dr. Marchand Wouter
- Dr. Van de Caveye Inge
- Dr. van den Heuvel Mariëtte

Verpleegkundige urologie Leslie Vrient

051 42 54 91

Spoedopname

T 051 42 50 67

Adres

Sint Andriesziekenhuis VZW
Bruggestraat 84
8700 Tielt

T 051 42 51 11

www.sintandriestielt.be

Bron: dienst urologie, Sint-Andriesziekenhuis,
08 september 2026, art._200

TIELT SINT-ANDRIES ZIEKENHUIS

Uw gezondheid, onze zorg.

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
T 051 42 51 11
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

08/09/26

TIELT SINT-ANDRIES ZIEKENHUIS

Uw gezondheid, onze zorg.

Prostaatpunctie

onder anesthesie

Wat houdt een prostaatpunctie in

Bij een prostaatpunctie wordt via de anus een echosonde geplaatst die de prostaat in beeld brengt. Dan wordt ofwel langs deze sonde ofwel via de huid tussen aars en scrotum verschillende keren een punctienaald in de prostaat gebracht om wat prostaatweefsel te bekomen. Dit weefsel wordt dan door de anatoompatholoog in het laboratorium onderzocht.

Voor de punctie

Het onderzoek vraagt geen speciale voorbereiding.

Als de biopsie wordt genomen langs de probe, niet doorheen de huid, moet u eenmalig een antibioticum innemen. Dit wordt voorgeschreven op de consultatie.

Bepaalde bloedverdunners moeten ook worden gestopt, ook dit wordt besproken op de consultatie.

U moet **nuchter** zijn, dat betekent drank en lichte maaltijd ten laatste 6 uur voor de procedure, en heldere vloeistof ten laatste 2 uur voor de procedure.

Verloop van de punctie

U wordt opgenomen op het chirurgisch dagziekenhuis. Van daaruit wordt u naar de operatiezaal gebracht waar het onderzoek doorgaat.

Eerst wordt u door de anesthesist onder narcose gebracht. Afhankelijk van de techniek die wordt gebruikt ligt u daarna in linker zijligging of in de beensteunen, waarna de echosonde in de anus wordt geplaatst. Aansluitend worden de biopsies genomen.

Na de punctie

U zult ongeveer 2 uur weg zijn van het dagziekenhuis, de tijd op de ontwaakruimte meegerekend.

U mag dezelfde dag naar huis, u mag niet zelf rijden. Door het nemen van de puncties kan de prostaat wat bloeden, het is dan ook niet abnormaal als u enige tijd (van dagen tot weken) wat bloed in de urine of het sperma ziet. Als er doorheen de darm wordt geprikt kunt u ook enkele dagen wat bloed in de stoelgang hebben.

U krijgt een afspraak mee voor het bespreken van het resultaat van de biopsies op de consultatie.

Mogelijke verwikkelingen

Infectie

Dit zal zich uiten door koorts, pijn bij het plassen, rillingen, ziek zijn. Op dat moment moet u zeker de huisarts of onze dienst contacteren, of de spoedgevallendienst van het ziekenhuis. Soms zijn enkele dagen opname voor intraveneuze antibiotica toediening noodzakelijk.

Plasproblemen door klontervorming

Dit is zeldzaam, om dit te voorkomen adviseren we u na de punctie enkele dagen wat meer te drinken dan anders, en regelmatig te gaan plassen.

Als u door de klonters niet meer kunt plassen contacteert u de huisarts, onze dienst of de spoedgevallendienst van het ziekenhuis.

Plasproblemen door zwelling van de prostaat na de biopsiename

Ook dit is zeldzaam. Als het gebeurt dat u niet meer kunt plassen contacteert u de huisarts, onze dienst of de spoedgevallendienst van het ziekenhuis.

Een prostaatpunctie geeft GEEN verhoogde kans op prostaatkanker.