

# Rectosigmoidoscopie

Informatiebrochure









Het onderzoek gebeurt niet onder sedatie (d.w.z. na toediening van een injectie met een slaapmiddel). Dit kan slechts bij uitzondering en na gesprek met de arts worden overwogen.

Het onderzoek gebeurt met een coloscoop. Dit is een fijne, soepele buis die via de aars in de dikke darm wordt gebracht en opgeschoven. Deze buis bevat zeer fijne vezels en een microcamera op het uiteinde die is aangesloten op een tv-toestel. Zo kan de arts rechtstreeks de binnenzijde van de darm bekijken (kleurenbeeld). Zo nodig kan doorheen de coloscoop een instrument worden ingebracht voor het afnemen van weefselstalen (onderzoek onder microscoop) of voor een behandeling (stelpen bloeding, wegname poliep, openmaken van vernauwing ...) Na het onderzoek kan u nog enige tijd krampen of een opgeblazen gevoel in de buik hebben. Dit is te wijten aan de lucht die bij het onderzoek in de darm werd geblazen om de darmwanden goed te bekijken. Deze last verdwijnt wanneer u de lucht laat ontsnappen door windjes te laten.











Uw gezondheid, onze zorg.

Sint-Andriesziekenhuis vzw  
Bruggestraat 84, 8700 Tiel  
T 051 42 51 11  
info@sintandriestielt.be  
www.sintandriestielt.be

Inwendige Ziekten

T 051 42 51 60  
interne@sintandriestielt.be  
www.gastrotielt.be

