

Slokdarm manometrie

Informatiebrochure



Doel en principe van een slokdarm manometrie

De slokdarm is een gespierde buis met boven- en onderaan een sluitspier. Doordat verschillende delen van de slokdarm afwisselend samentrekken en ontspannen, beweegt het voedsel zich naar de maag. Onderaan de slokdarm is er een sluitspier die afgesloten is maar die relaxeert bij het slikken van voedsel of bij het opgeven van lucht of bij overgeven.

Een slokdarm manometrie is het meest verfijnde onderzoek om de werking van de slokdarm te controleren. Bij dit onderzoek wordt de druk in de slokdarm gemeten om de spierbewegingen en de werking van de sluitspiers te beoordelen.

Een slokdarm manometrie wordt uitgevoerd om slikklachten (dysfagie) te onderzoeken. Bij klachten zoals pijn op de borst kan via dit onderzoek nagegaan worden of de pijn gerelateerd is aan de slokdarm. De functie van de onderste en bovenste sluitspiers van de slokdarm worden getest om te zien hoe goed ze openen en sluiten. Motiliteitsstoornissen worden opgespoord waarbij de spieren van de slokdarm niet goed samentrekken om het voedsel naar de maag te verplaatsen.

Voorafgaand aan de slokdarm manometrie is vaak al een gastroscopie uitgevoerd om letsels of vernauwingen in de slokdarm op te sporen.

Voorbereiding

U dient nuchter te zijn voor het onderzoek. Dat betekent 6 uur vooraf niet meer eten en drinken.

Verloop van het onderzoek

Het neusgat wordt verdoofd door middel van een spray. Het onderzoek is niet mogelijk onder een lichte verdoving, aangezien er zal gevraagd worden om te slikken.

Tijdens een slokdarm manometrie wordt een dunne katheter via de neus in de slokdarm en verder tot in de maag ingebracht. Het inbrengen van de katheter kan even onaangenaam zijn, maar is over het algemeen niet pijnlijk. Eens ter plaatse wordt de katheter vastgekleefd op de neus. Voor het onderzoek blijf je meestal rechtop zitten - maar soms vraagt men je toch te gaan liggen waarbij het onderzoek dan in ruglig wordt uitgevoerd.



Deze katheter is voorzien van sensoren die de druk in de slokdarm registreren.

Terwijl de katheter in de slokdarm zit, wordt de patiënt gevraagd om verschillende soorten vocht (zoals slokjes water) en voeding (zoals stukje boterham) in te nemen om de reactie van de slokdarm te observeren. De drukmeters in de katheter registreren de druk in de slokdarm tijdens deze slikbewegingen.

Na het onderzoek wordt de meetsonde verwijderd.

Duur

Het onderzoek duurt meestal ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag je terug naar huis.

Een slokdarm manometrie is veilig. Achteraf kan de neus en/of de keel wat geïrriteerd zijn door de passage van de sonde.

Kostprijs

De kostprijs voor de patiënt bedraagt 75 euro.

Uw onderzoek gaat door op

datum:

uur:

Aanmelden aan de kiosk in de inkomhal - gelijkvloers



Vragen en info

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen over dit onderzoek? Aarzel dan niet om deze voor uw onderzoek aan uw behandelend arts te stellen. Mocht u om dringende redenen uw afspraak niet kunnen nakomen, verwittigt u zo spoedig mogelijk het secretariaat inwendige geneeskunde. Er kan dan een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Secretariaat maag-, darm- en leverziekten

T 051 42 51 60

interne@sintandriestielt.be

1ste verdiep Route 30 wachtzaal C

Artsen

- Dr. De Coninck Steven
- Dr. Baertsoen Chantal
- Dr. De Decker Evelyne
- Dr. De Zutter Astrid
- Dr. D'hoedt Andrea
- Dr. Verhé Manon

Website dienst maag- darm- en leverziekten www.gastrotielt.be

Website Sint-Andriesziekenhuis www.sintandriestielt.be

Spoedopname

Buiten de kantooruren, in het weekend en op feestdagen kunt u voor dringende problemen langskomen tot de dienst spoedgevallen van het Sint-Andriesziekenhuis, voor vragen spoeddienst T 051 42 50 67



Uw gezondheid, onze zorg.

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
T 051 42 51 11
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

08/09/26

