


Hoe gebeurt het onderzoek?

Bij dit onderzoek maakt men gebruik van een zeer fijn, soepel buisje (2 mm) waarop zich een aantal meetpunten bevinden. Langs de neus (het neusgat wordt eerst verdoofd met een spray) wordt dit buisje (= sonde) voorbij de keel tot in de slokdarm geschoven (net boven de maagingang) door de endoscopieverpleegkundige. Waar de sonde uit de neus komt, wordt ze naar de wang gebogen en daar met een kleefpleister vastgemaakt. De sonde verloopt verder achter het oor, via de hals, over de romp en onder de kledij, tot het uiteinde verbonden is aan een klein computertje dat gedurende het onderzoek alle gegevens opslaat. Ter hoogte van de romp kan de sonde onder de kledij worden gestopt, de recorder wordt met een halsriem rond de hals gehangen.

Op de recorder staan druktoetsen, de endoscopieverpleegkundige zal u uitleggen hoe deze te gebruiken. De correcte positie van de sonde in de slokdarm wordt via een RX-opname gecontroleerd. Pas als we zeker zijn dat alles goed gepositioneerd is, starten we de meting, krijgt u nog wat uitleg (zie verder) en mag u daarna naar huis. De sonde blijft 24 uur ter plaatse gedurende dewelke de metingen gebeuren. Het plaatsen van de sonde doet geen pijn, maar kan eigenaardig aanvoelen met wat irritatie ter hoogte van de neus en keel. Tijdens het verloop van de meting verzwakt en verdwijnt deze irritatie en heeft u in principe geen last: u 'vergeet' als het ware dat er een sonde, recorder is. Het laten verwijderen van de sonde doet evenmin pijn: u voelt enkel het losmaken van de klever op het aangezicht.





Uw gezondheid, onze zorg.

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tiel
T 051 42 51 11
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

Inwendige Ziekten

T 051 42 51 60
interne@sintandriestielt.be
www.gastrotielt.be

