

Infliximab

Informatiebrochure



Infliximab (Remsima ®)

Infliximab is een biologisch geneesmiddel dat via een infuus of injectie wordt toegediend. Het blokkeert het eiwit TNF-alfa, een ontstekingsmolecule die mee verantwoordelijk is voor de ontstekingsreactie in de darm. Hierdoor neemt de ontsteking in de darm af.

1. Opstartfase

Voor de behandeling start, wordt u gecontroleerd op (in)actieve tuberculose en andere ernstige infecties (zoals hepatitis). Hiervoor zal er een longfoto gebeuren (Rx thorax), bloedafname en zo nodig een Mantouxtest.

De eerste drie infusen worden tijdens de opstartfase op: week 0, week 2 en week 6 toegediend.

Infliximab wordt intraveneus toegediend in het dagziekenhuis. De dosis is in functie van uw gewicht: 5mg/kg en wordt afgerond.

De eerste toedieningen gebeuren langzamer en hierbij dient de patiënt ook langer na te blijven om eventuele overgevoelighedsreacties tijdig op te merken en te behandelen.

- Als u colitis ulcerosa heeft, zal er op week 10 à 14 een linker coloscopie (darmonderzoekje van het laatste stukje van de darm, zonder verdoving) gebeuren om ziekte verder te evalueren.
- Bij de ziekte van Crohn vragen we op week 6 een stoelgangstaal binnen te brengen

Verloop van een infuustoediening

Indien u koorts heeft, zich ziek voelt of om één of andere reden niet op uw dagopname aanwezig kan zijn, gelieve minimum 24 uur op voorhand de IBD-verpleegkundige Ann te verwittigen op 051 425 691 of IBD@sintandriestielt.be.

Schrijf u in bij de kiosk aan de ingang van het ziekenhuis. Bij opstart kan u 'voorinschrijven' voor 1 jaar aan de receptie. Dwz dat u bij iedere volgende dagopname nog enkel het e-ID moet ingeven in de kiosk en u meteen zal doorverwezen worden naar boven waar armbandje en etiketten zullen klaarliggen. U hoeft niet nuchter te zijn.

Ga naar route 30, wachtzaal C. De arts zal u binnenroepen in zijn/haar consultatieruimte. Indien u voor namiddag-/avondtoediening komt, gaat u meteen naar het dagziekenhuis.

Na consultatie bij de arts gaat u naar het dagziekenhuis inwendige route 34, 2de verdieping en meldt u zich aan bij de centrale verpleegpost.



- Gebruikte spuiten en pennen moeten in een naaldcontainer worden weggegooid. Een volle naaldcontainer kunt u naar het containerpark brengen. Een nieuwe naaldcontainer kan u kopen in de thuiszorgwinkel (met korting als CM-lid).
- Als u met het vliegtuig op reis gaat dan kan u een 'reispassje' laten invullen door uw arts. Hierop staat vermeld dat u de medicatie kunt meenemen in de handbagage op het vliegtuig. De medicatie mag niet in uw grote bagage in het luchtruim omdat de temperatuur daar te koud is en de medicatie zo kapot kan gaan.
- Hebt u een afspraak bij een arts of tandarts of moet u een specifieke ingreep ondergaan? Zeg dan altijd dat u een behandeling krijgt met infliximab. Laat uw behandelende arts ook weten als u een ingreep moet ondergaan.

2/ De onderhoudsbehandeling in infuusvorm

In de onderhoudsfase worden de infusen om de 8 weken toegediend. Het eerst volgende infuus na de opstart (week 0-2-6) valt dus op week 14. Volgende infusen volgen op week 22, 30, 38... Vanaf week 22 bedraagt de inlooptijd nog 1u en dient u nadien nog 1 uur na te blijven.

Afhankelijk van de dalspiegel (= hoeveelheid medicatie in uw bloed net voor een volgende toediening) of bij onvoldoende respons op de therapie kan de tijdsperiode tussen 2 infusen aangepast worden (of de dosis verhoogd worden). In dat geval krijgt u de volgende dosis sneller, bijvoorbeeld om de 4 of om de 6 weken



Opstart	Planning
Voor start	Bloedafname, longfoto, vaccinaties, darmonderzoek (stoelgangsonderzoek/beeldvorming NMR enterografie), contact IBD-verpleegkundige
Week 0	Toediening van het 1e infuus
Week 2	Toediening van het 2e infuus
Week 6: indien onderhoud met infusen	Toediening van het 3e infuus

1/ Onderhoud met spuitjes	Planning
Week 6	1e spuitje onder begeleiding IBD-VPK
Week 8	2e spuitje onder begeleiding IBD-VPK
Week 10	3e spuitje zelfstandig
Week 12	Consultatie arts + linker coloscopie, stoelgangstest
6 maanden na start (= ong 3 maand na 1e spuitje)	Consultatie arts + bloedafname + voorschriften
9 maanden na start	Consultatie arts (+ labo)+ voorschriften
1 jaar na start	Ileocoloscopie + labo (+stoelgangstest,NMR enterografie) + voorschriften
Nadien verdere opvolging om de 6 maanden	

2/ Onderhoud met infusen	Planning
Week 14	Toediening volgend infuus (+linker coloscopie bij colitis ulcerosa)
Week 22	Toediening volgend infuus
Week ... (om de 8 weken)	Toediening volgend infuus
1 jaar na start behandeling	Ileocoloscopie (+stoelgangstest,NMR enterografie)







Uw gezondheid, onze zorg.

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tiel
T 051 42 51 11
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

Inwendige Ziekten

T 051 42 51 60
interne@sintandriestielt.be
www.gastrotielt.be



02/06/26

