

# Anale manometrie

## Informatiebrochure



## Doel en principe van een anale manometrie

Een anale manometrie is een onderzoek waarbij de druk ter hoogte van de sluitspier gemeten wordt en waarbij ook reflexen worden getest.

Bij een anale manometrie wordt rectaal een sonde ingebracht om de werking van de sluitspier en laatste deel endeldarm te beoordelen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij klachten zoals verstopping (constipatie), gevoel van onvolledige lediging, moeilijkheden bij het uitdrijven van stoelgang of incontinentie voor stoelgang, waarbij de werking van de kringspier een rol kan spelen.

## Voorbereiding

Om het onderzoek correct te laten verlopen, moet het onderste stukje van de darm vrij van stoelgang zijn. Daarom is het noodzakelijk dat je thuis 2 uur vóór het onderzoek een lavement (Cleen Enema) opspuit via de aars. Dit lavement is vrij te verkrijgen zonder voorschrift via uw apotheek. Wanneer je het lavement gebruikt, probeer dan de vloeistof 5 tot 10 minuten op te houden vooraleer je naar het toilet gaat. U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.

## Verloop van het onderzoek


De patiënt mag op de linkerzijde gaan liggen.

De arts brengt een vinger met glijmiddel in het anale kanaal en vraagt ook om eens toe te knijpen en om te persen om een indruk te krijgen van de functie van de sluitspier.

Tijdens het onderzoek wordt een dunne sonde (van ongeveer 5mm) langs de anus ingebracht, tot ongeveer 10 cm in de endeldarm. Het plaatsen van de sonde is niet pijnlijk.


Aan de tip van de sonde zit een ballon. Door die op te blazen, bootsen we de vulling van de darm met stoelgang na.

Het vullen veroorzaakt uitzetting van de darm. Dat lokt een reflex uit die we registreren.



- 2 We meten de druk in rust, bij het aanspannen van de sluitspier (persen) en bij het ontspannen van de sluitspier.





Tijdens het onderzoek gaan we ook de gevoeligheid van de endeldarm na. We vragen wanneer het opblazen van de ballon (als stoelgang) ervaren wordt, en wanneer er echt stoelgangsdwang gevoeld wordt.

De sonde wordt nadien verwijderd.

Daarna volgt nog een ballonexpulsietest waarbij gevraagd wordt aan de patiënt om de ballon uit te persen op het toilet.

## Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

## Na het onderzoek

Er is geen specifieke nazorg nodig.

## Kostprijs

De kostprijs voor de patiënt bedraagt 100 euro.

### Uw onderzoek gaat door op

datum: .....

uur: .....

**Aanmelden aan de kiosk in de inkomhal - gelijkvloers**

## Vragen en info

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen over dit onderzoek? Aarzel dan niet om deze voor uw onderzoek aan uw behandelend arts te stellen. Mocht u om dringende redenen uw afspraak niet kunnen nakomen, verwittigt u zo spoedig mogelijk het secretariaat inwendige geneeskunde. Er kan dan een nieuwe afspraak gemaakt worden.

### Secretariaat maag-, darm- en leverziekten

T 051 42 51 60

interne@sintandriestielt.be

1ste verdiep Route 30 wachtzaal C

### Artsen

- Dr. De Coninck Steven
- Dr. Baertsoen Chantal
- Dr. De Decker Evelyne
- Dr. De Zutter Astrid
- Dr. D'hoedt Andrea
- Dr. Verhé Manon

Website dienst maag- darm- en leverziekten [www.gastrotielt.be](http://www.gastrotielt.be)

Website Sint-Andriesziekenhuis [www.sintandriestielt.be](http://www.sintandriestielt.be)

### Spoedopname

Buiten de kantooruren, in het weekend en op feestdagen kunt u voor dringende problemen langskomen tot de dienst spoedgevallen van het Sint-Andriesziekenhuis, voor vragen spoeddienst T 051 42 50 67



Uw gezondheid, onze zorg.

Sint-Andriesziekenhuis vzw  
Bruggestraat 84, 8700 Tielt  
T 051 42 51 11  
[info@sintandriestielt.be](mailto:info@sintandriestielt.be)  
[www.sintandriestielt.be](http://www.sintandriestielt.be)

08/09/26

